n.° 50.

Observation

Sur le bon effet de la cigue administrée
tant intérieurement qu'exterieurement

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C 32 A 3 fil

Dans le sejour que jay fais à Passy l'année derniere avec feu mgr. le Duc D'uzès à qui j'avois l'honneur d'être attaché en qualité de chirurgien. je fus mandé pour voir la femme de Jean Robin Carrier demeurant au même vilage de Passy. je trouvai à cette femme les deux mammelles tumefiées et scirreuses, tout le corps glanduleux paroissoit être compris, il y avoit à la mammelle droite au dessus du mammelon un ulcère de la largeur d'une piéce de 24 sols. les bords étoient durs et renversés. il découloit une sanie virulente. les douleurs qu'elle ressentoit dans les deux mammelles ne luy avoient permis aucun repos pendant la nuit depuis dix huit mois que cette maladie avoit commencée.

Je remarquai aussi que les deux crystallins étoient devenus opaques au dégrés de l'empêcher de distinguer les objets.

Cette femme me dit que cette maladie avoit commencée par une suspension de ses regles qui

ARC 21 d 1 n° 2

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

avoit été suivie d'un prurit à un des mammelons et d'un erysipele à toute la mammelle gauche, que depuis ce tems, malgrés tous les remedes qu'on luy avoit prescrit. on ne luy avoit procuré aucun soulagement, qu'au contraire, la mammelle droite s'étoit engorgée et que par degrés l'ulcere s'étoit formé.

Sur le rapport qu'elle me fit que tous les remedes avoient été inutiles quoique sagements administrés, je crus devoir tanter l'usage de la cigue tant intérieurement, qu'extérieurement. pour l'intérieur je luy fis prendre en extrait par degrés, en commençant par un grain que j'ay continué jusqu'à vingt quatre. pour topique, j'en fis usage deux fois par jour en forme de cataplâme que je continuai l'espace de deux mois et demi, observant de la purger tous les huit jours. je joignis à l'usage de la cigue des bouillons altérans composés avec le veau, les feuilles de cresson, de cochlearia, et de fumeterre. j'eus la satisfaction par cette conduite de voir la malade guerie non seulement des deux tumeurs et de l'ulcére aux mammelles, mais encore l'opacité des crystallins détruite au point que la malade est dans le cas de distinguer les objets et de satisfaire aux devoirs qu'exigent son ménage. j'ay

crû devoir faire à cette femme un cautère au bras, afins de la mettre à l'abry de tous les accidens qui auroient pû survenir.

Pour faire l'extrait de cigue, je pilai une brassée de feuilles et de fleurs que je mis avec un peu d'eau dans un pot de terre vernissé et le celai hermetiquement. je la fis bouillir à petit feu l'espace de douze heures, j'exprimai le jus que je fis évaporer par le feu jusqu'à consistence d'extrait.

Mr. Tournefort ne connoît aux environs de Paris que deux sortes de cigue, il nomme la premiere cicuta major c. B. pin (a) la seconde cicuta minor petroselioro. similis c. B. pin (b). je pense qu'il y en a une supérieure à la major que l'on pourroit appeller maxima. voici ma raison: celle que je prenois dans le jardin des minimes de passy étoit bien différente de celle de la campagne, celle cy ne surpassoit guéres trois pieds et demie de hauteur, tandis que l'autre en avoit au moins six. l'odeur de celle des champs n'étoit point à beaucoup près si forte et les feuilles n'étoient pas si larges, ny si épaisses que celles des minimes. quand j'employois

---

(a) IV.e herborisation. pag. 31.

(b) V. herborisation pag. 308.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

celle de la campagne, la malade s'en apperçevoit très-bien, car le soulagement étoit bien moins grand.

Quoique j'aye examiné attentivement la structure et les effets de ces deux sortes de ciguë je désirerois pour le progrès de l'art que dans la nouvelle saison, on répéta mon expériençe et qu'on la trouva conforme à ce que je viens d'avancer.

Geme